



ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL COM PALATABILIZANTE PARA CÃES E GATOS

Uso Veterinário

Comprimidos bissulcados.

FÓRMULA

Preditabs	5 mg	10 mg	20 mg
Prednisolona	5 mg	10 mg	20 mg
Excipientes q.s.p.	100 mg	200 mg	400 mg

DESCRIÇÃO

Preditabs é um anti-inflamatório esteroideal (AIE) à base de prednisolona, pertencente à família dos glicocorticoides. Apresenta potente atividade anti-inflamatória e imunossupressora, além de menor efeito mineralocorticoide em comparação ao cortisol, diminuindo a retenção de sódio e água corporal, minimizando efeitos colaterais.

A prednisolona é comumente utilizada para tratar dermatopatias alérgicas, além de distúrbios endócrinos com reposição de glicocorticoides, tratamento de quadros reumáticos, hematológicos e outras condições inflamatórias, alérgicas ou de edema.

FARMACODINÂMICA

A prednisolona, administrada por via oral, é absorvida rapidamente pelo organismo, sendo o fígado, responsável pela maior parte do processo de biotransformação dos glicocorticoides. A partir da transformação em compostos hidrossolúveis, os glicocorticoides são excretados principalmente pela via renal, e uma parte é metabolizada e adicionada a bile, para ser excretada pela via intestinal.

FARMACOCINÉTICA

A prednisolona, administrada por via oral, é absorvida rapidamente pelo organismo, sendo o fígado, responsável pela maior parte do processo de biotransformação dos glicocorticoides. A partir da transformação em compostos hidrossolúveis, os glicocorticoides são excretados principalmente pela via renal, e uma parte é metabolizada e adicionada a bile, para ser excretada pela via intestinal.

INDICAÇÕES

Preditabs é indicado no tratamento de inflamações decorrentes de diferentes patologias que acometem os cães e gatos.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, porém foram conduzidos estudos pela empresa fabricante que demonstraram que o produto apresenta as características desejadas e necessárias de eficácia e segurança para a indicação a que se destina, obtendo, dessa forma, emissão de Licença Provisória.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR

Preditabs é apresentado na forma de comprimidos bissulcados, que devem ser administrados via oral, na dose de 0,5 mg/kg para cães e 1 mg/kg para gatos, a cada 24 horas, por 5 dias consecutivos:

Tabelas de doses Cães (0,5 mg/kg)				Tabelas de doses Gatos (1 mg/kg)		
Peso	Preditabs 5 mg	Preditabs 10 mg	Preditabs 20 mg	Peso	Preditabs 5 mg	Preditabs 10 mg
Até 2,5 kg	1/4 cp.			Até 1,25 kg	1/4 cp.	
2,5 - 5 kg	1/2 cp.	1/4 cp.		1,25 - 2,5 kg	1/2 cp.	
5 - 7,5 kg	3/4 cp.	1/2 cp.		2,5 - 3,75 kg	3/4 cp.	
7,5 - 10 kg	1 cp.	1/2 cp.	1/4 cp.	3,75 - 5 kg	1 cp.	1/2 cp.
10 - 15 kg		3/4 cp.	1/2 cp.	5 - 6,25 kg	1 e 1/4 cp.	3/4 cp.
15 - 20 kg		1 cp.	1/2 cp.	6,25 - 7,5 kg	1 e 1/2 cp.	3/4 cp.
20 - 30 kg			3/4 cp.	7,5 - 8,75 kg	1 e 3/4 cp.	1 cp.
30 - 40 kg			1 cp.	8,75 - 10 kg	2 cp.	1 cp.

A posologia deve ser adequada conforme a finalidade do tratamento e severidade do quadro clínico, de acordo com as orientações e acompanhamento do médico-veterinário. O tratamento pode ser estendido por até 7 dias.

Nos casos de extensão do tratamento, pode haver necessidade de fazer o desmame do medicamento, administrando uma dose menor em dias alternados, para que ocorra a recuperação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, reduzindo as chances de efeitos colaterais.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não administrar **Preditabs** concomitantemente com outros corticosteroides ou anti-inflamatórios não esteroides que possam exacerbar os efeitos adversos gastrointestinais.

Indutores enzimáticos podem acelerar a eliminação dos corticosteroides, como por exemplo a fenilbutazona, fenitoína, organoclorados e o fenobarbital.

O uso de corticosteroides com glicosídeos cardíacos pode aumentar a possibilidade de arritmias ou intoxicação digitalica associada à hipocalcemia. No uso de corticosteroides em animais diabéticos pode haver a necessidade de aumento da dose de insulina.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

O produto é contraindicado para uso em animais com histórico de hipersensibilidade a prednisolona. Utilizar com cautela e acompanhamento do médico-veterinário em animais com enteropatias, doenças infecciosas, pancreatites, doenças renais, hemorragias e/ou perfurações, diabetes mellitus, úlceras gastrointestinais, hipotireoidismo, cardiopatias e animais em fase de crescimento. Não se recomenda a aplicação de vacinas em animais submetidos ao tratamento com corticoideterapia. Não foram realizados estudos de segurança em fêmeas gestantes ou em fase de lactação. Não foram realizados estudos de segurança em animais com idade inferior a 2 (dois) meses de idade.

PRECAUÇÕES

Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto. Não utilizar o produto vencido. O descarte deve ser realizado de acordo com a legislação vigente.

Em caso de uso prolongado de glicocorticoides, de acordo com a recomendação e acompanhamento do médico-veterinário, o protocolo de desmame é recomendado. A interrupção abrupta da terapia glicocorticoide pode ocasionar letargia, fraqueza, vômito e diarreia.

REAÇÕES ADVERSAS

De acordo com os estudos clínicos realizados, o **Preditabs** foi considerado seguro para cães e gatos, a partir de 2 meses de vida. Não são esperadas reações adversas com o uso do **Preditabs**, quando administrado conforme orientações em bula.

As reações adversas ao uso dos glicocorticoides são geralmente devidas ao uso prolongado com doses elevadas, podendo incluir fragilidade da epiderme, ganho de peso, maior risco de infecções e lesões, hipertensão, hiperglicemia e dislipidemia.

O uso crônico com corticoideterapia pode levar à síndrome de Cushing iatrogênica, caracterizada por poliúria, polidipsia, alopecia bilateral simétrica, aumento da suscetibilidade a infecções, miopatia periférica, atrofia muscular e redistribuição da gordura corporal.

Em caso de reações adversas, procure imediatamente um médico-veterinário levando consigo a embalagem e entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente e farmacovigilância.

APRESENTAÇÕES

Preditabs 5 mg: Cartucho contendo 1 strip com 10 comprimidos.

Preditabs 10 mg: Cartucho contendo 1 strip com 10 comprimidos.

Preditabs 20 mg: Cartucho contendo 1 strip com 10 comprimidos.

CONSERVAÇÃO

Conservar o produto à temperatura ambiente, entre 15° C e 30° C, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

PRAZO DE VALIDADE

O período de validade do produto é de 2 (dois) anos a partir da data de fabricação. Após o particionamento do comprimido, utilizar o remanescente em até 09 dias.

Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico veterinário.

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 170/2024 em 27/09/2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO MÉDICO VETERINÁRIO

Dr. Danillo Silva Marcon - CRMV-SP 36.982.

PROPRIETÁRIO

Laboratório Bio-Vet Ltda.

R. Cel. José Nunes dos Santos, 639

06731-320 - Vargem Grande Paulista - SP

CNPJ 60.411.527/0001-30

INDÚSTRIA BRASILEIRA

FABRICANTE

Ipanema Indústria de Produtos

Veterinários Ltda.

Município de Araçoiaba da Serra

Rodovia Raposo Tavares Km 113 -SP

CNPJ: 64.687.015/0001-52

INDÚSTRIA BRASILEIRA



Acesse a bula e outras informações sobre este medicamento usando o código ao lado.

Obrigado por nos deixar cuidar da saúde do seu pet!



faleconosco@biovet.com.br



WhatSac:

(11) 9 9545-5595



SAC:

0800 055 6642

bioVet
vet para todos

www.biovet.com.br

1681-me